

GRAMILANT 12,5 EC

Herbicida de uso agrícola

INFORMACIÓN GENERAL

INGREDIENTE ACTIVO	Haloxifop-P-Metil
NOMBRE QUÍMICO	methyl (R)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionate
GRUPO QUÍMICO	Arilfenoxi
CONCENTRACIÓN	12,5% p/v
FORMULACIÓN	Concentrado emulsionable (EC)
FABRICANTE Y FORMULADOR	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	IV

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

GRAMILANT 12,5 EC es un herbicida selectivo post emergente para el control de malezas anuales y gramíneas perennes. Es un inhibidor de la acetil CoA carboxilasa (ACCase) y es absorbido por el follaje y las raíces y traslocado a los tejidos meristemáticos, inhibiendo el crecimiento de las malezas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Melón (*Cucumis melo*), Pepino (*Cucumis sativus*), Sandía (*Citrullus vulgaris*), Calabaza, calabacín, zuchini (*Cucurbita pepo*), Chile (*Capsicum annum*), Tomate (*Lycopersicum esculentum*), Berenjena (*Solanum melongena*), Frijol (*Phaseolus vulgaris*), Ajo (*Allium sativum*), Cebolla (*Allium cepa*), Lechuga (*Lactuca sativa*), Maní, cacahuete (*Arachis hipogea*), Piña (*Ananas comosus*), Soya (*Glycine max*)

MALEZAS QUE CONTROLA: En Melón, Pepino, Sandía, Calabaza, calabacín, zuchini: Pajarera (*Echinochloa gracilis*), Bromo (*Bromus carinatus*), Zacate gramma (*Cynodon dactylon*). En Chile, Tomate, Berenjena: Zacate gramma (*Cynodon dactylon*), Zacate de agua (*Eragrostis mexicana*), Zacate azul (*Sporobolus indicus*), Bromo (*Bromus carinatus*). En Frijol: Bromo (*Bromus carinatus*), Zacate azul (*Sporobolus indicus*), Zacate gramma (*Cynodon dactylon*). En Ajo, Cebolla: Bromo (*Bromus carinatus*), Zacate bahía (*Paspalum notatum*), Zacate pitillo (*Ixophorus unisetus*), Zacate agrarista (*Cynodon dactylon*). En Lechuga: Bromo (*Bromus carinatus*), Zacate casamiento (*Eragrostis mexicana*), Pasto alambre (*Sporobolus indicus*). En Maní, cacahuete: Pasto alambre (*Sporobolus indicus*), Zacate de agua (*Echinochloa crus-galli*). En Piña: Zacate frente de toro (*Digitaria sanguinalis*), Zacate amargo (*Digitaria insularis*), Zacate caracolillo o guatemalteco (*Eragrostis ciliaris*). En Soya: Zacate horquetilla (*Brachiaria plantaginea*), Alpistillo (*Phalaris minor*), Zacate liendrilla (*Leptochloa filiformis*).

DOSIS RECOMENDADA: En Melón, Pepino, Sandía, Calabaza, calabacín, zuchini: 1,0-1,5 litros/ha. En Chile, Tomate, Berenjena: 1,0-1,5 litros/ha. En Frijol: 1,0-1,5 litros/ha. En Ajo, Cebolla: 0,5-1,0 litros/ha. En Lechuga: 0,5-1,0 litros/ha. En Maní, cacahuete: 0,5-1,5 litros/ha. En Piña: 2,0-3,0 litros/ha. En Soya: 0,5-1,0 litros/ha.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. No debe de mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previamente.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

FICHA TÉCNICA

PERÍODO DE CARENIA: En lechuga: 28 días. En melón, pepino, sandía, calabaza, calabacín, zucchini y piña: 40 días. En chile, tomate, berenjena, frijol, ajo, cebolla y soya: 60 días. En maní o cacahuate: 80 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas.

Fecha de modificación: 05-enero-2014

Rainbow